On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $f(x) = 5 - \frac{4}{x+2}$.

Exercice 1

1. $f'(x) = 0 - \frac{0(x+2) - 4 \times 1}{(x+2)^2} = \frac{4}{(x+2)^2} > 0$ sur $[0; +\infty[$.

Donc la fonction f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

2. On résout dans $[0; +\infty[$ l'équation $f(x) = x$:

$$f(x) = x \iff 5 - \frac{4}{x+2} = x \iff \frac{5(x+2) - 4 - x(x+2)}{x+2} = 0 \iff \frac{5x+10-4-x^2-2x}{x+2} = 0$$

$$\iff \frac{-x^2+3x+6}{x+2} = 0 \iff -x^2+3x+6=0 \text{ et } x+2 \neq 0$$

On résout $-x^2+3x+6=0$; $\Delta = 9 - 4 \times 6 \times (-1) = 33 > 0$.

Les solutions sont donc $\frac{-3-\sqrt{33}}{-2} = \frac{3+\sqrt{33}}{2}$ et $\frac{3-\sqrt{33}}{2}$.

Cette deuxième solution est négative donc l'unique solution de l'équation $f(x) = x$ dans l'intervalle $[0; +\infty[$ est $\alpha = \frac{3+\sqrt{33}}{2} \approx 4,37$.

3. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

Sur la figure de **annexe 1**, on place les points M_0, M_1 et M_2 d'ordonnée nulle et d'abscisses respectives u_0, u_1 et u_2 ; voir page 7.

On peut conjecturer que la suite (u_n) est croissante et converge vers α .

4. a. Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$.

- Pour $n = 0$, $u_n = u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_1 = f(u_0) = 5 - \frac{4}{1+2} = \frac{11}{3}$; de plus $\alpha \approx 4,37$.

On a $0 \leq 1 \leq \frac{11}{3} \leq \alpha$ ce qui veut dire que la propriété est vraie au rang 0.

- On suppose la propriété vraie au rang $p \geq 0$, autrement dit : $0 \leq u_p \leq u_{p+1} \leq \alpha$.

On sait d'après la question 1. que la fonction f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$; donc : $0 \leq u_p \leq u_{p+1} \leq \alpha \implies f(0) \leq f(u_p) \leq f(u_{p+1}) \leq f(\alpha)$

$f(0) = 3 \geq 0$, $f(u_p) = u_{p+1}$ et $f(u_{p+1}) = u_{p+2}$.

De plus, α est solution de l'équation $f(x) = x$ donc $f(\alpha) = \alpha$.

On a donc $0 \leq u_{p+1} \leq u_{p+2} \leq \alpha$; on peut dire que la propriété est vraie au rang $p+1$.

- La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire; donc la propriété est vraie pour tout entier naturel n .

On a donc démontré que, pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$.

b. Pour tout n , $u_n \leq u_{n+1}$ donc la suite (u_n) est croissante.

Pour tout n , $u_n \leq \alpha$ donc la suite (u_n) est majorée par α .

Donc, d'après le théorème de la convergence monotone, la suite (u_n) est convergente.

5. Pour tout entier naturel n , on définit la suite (S_n) par $S_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

a. $S_0 = u_0 = 1$; $S_1 = u_0 + u_1 = 1 + \frac{11}{3} = \frac{14}{3} \approx 4,67$

$S_2 = u_0 + u_1 + u_2 = S_1 + u_2$; $u_2 = f(u_1) = f\left(\frac{11}{3}\right) = \frac{73}{17}$ donc $S_2 = \frac{14}{3} + \frac{73}{17} = \frac{457}{51} \approx 8,960$ donc $S_2 \approx 8,96$.

b. On complète l'algorithme donné en annexe 2 pour qu'il affiche la somme S_n pour la valeur de l'entier n demandée à l'utilisateur; voir page 7.

c. On sait que la suite (u_n) est croissante donc, pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n \geq u_0$.

Or $u_0 = 1$, donc, pour tout n , $u_n \geq 1$ et donc $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n \geq n+1$.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} n+1 = +\infty$ donc, d'après les théorèmes de comparaison sur les limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

Exercice 2

1. Nous avons une équation de degré 2, à coefficients réels. On va donc calculer le discriminant Δ du trinôme du second degré.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 16 = 16 - 4 \times 16 = -3 \times 16 = -48.$$

Le discriminant étant strictement négatif, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées, qui sont : $Z_1 = \frac{-4 - i\sqrt{48}}{2} = \frac{-4 - 4i\sqrt{3}}{2} = -2 - 2i\sqrt{3}$ et $Z_2 = \overline{Z_1} = -2 + 2i\sqrt{3}$.

Présentons maintenant ces nombres sous leur forme exponentielle, en commençant par calculer le module de Z_1 : $|Z_1| = \sqrt{(-2)^2 + (-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = 4$.

$$\text{On peut donc écrire : } Z_1 = 4 \times \left(\frac{-2}{4} + i \frac{-2\sqrt{3}}{4} \right) = 4 \times \left(\frac{-1}{2} + i \frac{-\sqrt{3}}{2} \right).$$

Un argument de Z_1 sera donc un angle dont le cosinus est $\frac{-1}{2}$ et le sinus est $\frac{-\sqrt{3}}{2}$, donc $\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$ dont la mesure principale est $\frac{-2\pi}{3}$.

La forme exponentielle de Z_1 est donc : $Z_1 = 4e^{\frac{-2i\pi}{3}}$, et puisque Z_2 est le conjugué de Z_1 , d'après les propriétés des modules et arguments : $Z_2 = 4e^{\frac{2i\pi}{3}}$. L'équation admet donc deux solutions, qui sous leurs formes exponentielles sont : $Z_1 = 4e^{\frac{-2i\pi}{3}}$ et $Z_2 = 4e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

2. Si a a pour module 2 et pour argument $\frac{\pi}{3}$, alors $a = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ et donc, d'après les propriétés du module et des arguments, $a^2 = 2^2 e^{2 \times i\frac{\pi}{3}}$, donc on a $a^2 = Z_2$ et donc la forme algébrique de a^2 est $-2 + 2i\sqrt{3}$.

Le nombre a est donc une solution à l'équation dont on parle dans cette

question. L'autre solution sera donc $-a$, car $(-a)^2 = a^2$, donc si a est une solution, $-a$ en sera une aussi. On va donc présenter les deux solutions sous forme algébrique, comme demandé :

$$a = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2 \times \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + i\sqrt{3} \text{ et } -a = -1 + i \times (-\sqrt{3}).$$

3. Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes. Il existe donc quatre nombres réels x_1 ; y_1 ; x_2 et y_2 tels que $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$.

$$\begin{aligned} \text{On a alors } z_1 z_2 &= (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) \\ &= x_1 x_2 + ix_1 y_2 + iy_1 x_2 + i^2 y_1 y_2 \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1) \end{aligned}$$

Comme les nombres x_1 , x_2 , y_1 et y_2 sont réels, alors on peut définir les nombres $x_3 = x_1 x_2 - y_1 y_2$ et $y_3 = x_1 y_2 + x_2 y_1$, qui sont réels également.

On a donc écrit le produit $z_1 z_2$ sous la forme $x_3 + iy_3$, où x_3 et y_3 sont des nombres réels, donc le conjugué de $z_1 z_2$ est :

$$\overline{z_1 z_2} = x_3 - iy_3 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Par ailleurs, calculons le produit : $\overline{z_1} \overline{z_2} = (x_1 - iy_1) \times (x_2 - iy_2)$

$$\overline{z_1} \overline{z_2} = x_1 x_2 - ix_1 y_2 - iy_1 x_2 + (-i)^2 y_1 y_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - i(x_1 y_2 + x_2 y_1) = \overline{z_1 z_2}$$

Nous avons donc démontré que pour deux nombres complexes quelconques z_1 et z_2 , on a : $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$.

La seconde propriété sera démontrée par récurrence. Posons, pour tout entier naturel n non nul la propriété $\mathcal{P}_n$, qui dit que pour tout complexe z , on a $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$.

Initialisation : Pour $n = 1$, on a $z^1 = z$, donc $\overline{z^1} = \overline{z} = (\overline{z})^1$: la propriété $\mathcal{P}_1$ est donc vraie.

Hérédité : Pour un entier k naturel non nul, on suppose vraie la propriété $\mathcal{P}_k$, c'est à dire que l'on suppose que pour tout complexe z , on a $\overline{z^k} = (\overline{z})^k$.

On souhaite maintenant démontrer que si cette propriété est vraie, alors la propriété suivante doit être vraie aussi.

Soit z un nombre complexe. On s'intéresse donc à $\overline{z^{k+1}}$. On a $z^{k+1} = z^k \times z$,

$$\begin{aligned} \text{donc : } \overline{z^{k+1}} &= \overline{z^k \times z} \\ &= \overline{z^k} \times \overline{z} \quad \text{application de la propriété précédente.} \\ &= (\overline{z})^k \times \overline{z} \quad \text{par hypothèse de récurrence.} \\ &= (\overline{z})^{k+1} \quad \text{ce qui constitue la propriété } \mathcal{P}_{k+1}. \end{aligned}$$

Nous avons donc démontré que si la propriété $\mathcal{P}_k$ est vraie, cela implique que $\mathcal{P}_{k+1}$ l'est également : la propriété est héréditaire.

Conclusion : La propriété est vraie au rang 1 et est héréditaire, donc, on peut donc dire que pour tout entier n naturel non nul, et pour tout nombre complexe z , on a $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$.

4. Soit z une solution de l'équation (E) , cela signifie que l'on a : $z^4 + 4z^2 + 16 = 0$.

Vérifions maintenant si le conjugué de z est une solution de l'équation :

$$\overline{z^4 + 4z^2 + 16} = \overline{z^4} + \overline{4z^2} + \overline{16} \quad \text{dernière propriété démontrée.}$$

$$= \overline{z^4} + \overline{4z^2} + 16 \quad \text{première propriété démontrée}$$

sachant que $4 = \overline{4}$, car 4 est réel.

$$= \overline{z^4 + 4z^2 + 16} \quad \text{somme des conjugués.}$$

$$= \overline{0} \quad \text{car } z \text{ est solution de } (E).$$

$$= 0 \quad \text{car 0 est réel, donc est son propre conjugué.}$$

On a établi à la question 2. que les nombres a et $-a$ sont tels que $a^2 = Z_2$ et $(-a)^2 = Z_2$.

Comme par ailleurs on a dit que Z_2 est solution de l'équation $Z^2 + 4Z + 16 = 0$, cela signifie que $(a^2)^2 + 4(a^2) + 16 = 0$, donc que $a^4 + 4a^2 + 16 = 0$, donc a est solution de (E) et de la même façon, $-a$ est aussi une solution de cette équation.

En appliquant la propriété démontrée au début de cette question, on en dé-

duit que les nombres $\overline{a}$ et $-\overline{a}$ sont également des solutions à cette équation.

Nous avons donc 4 solutions à l'équation, qui sont distinctes : $a = 1 + i\sqrt{3}$; $-a = -1 - i\sqrt{3}$; $\overline{a} = 1 - i\sqrt{3}$ et $-\overline{a} = -1 + i\sqrt{3}$, donc puisqu'il y a au maximum 4 solutions à l'équation, celle-ci ne peut avoir d'autre solution que celles trouvées, et donc l'équation (E) a été résolue.